

Termin vereinbaren

Möchten auch Sie Zahnverlust nachhaltig vorbeugen, dann vereinbaren Sie einen Termin zur **SOLO-Prophylaxe** bei Ihrem Zahnarzt.

Praxisstempel

*An dieser Studie beteiligten sich Neupatienten aus drei zertifizierten SOLO-Prophylaxe-Praxen (Dr. Nicola Huber, München; Dr. Eva Kupke-Komoroczy, Rosenheim; Dr. Fahrholz & Lichtinger, Freising). Das renommierte Labor Lab4More in München führte die Untersuchungen unter Leitung von Herrn Dr. med. Rasshofer durch.

SOLO Prophylaxe

E info@solo-med.de

W www.solo-med.de

W www.solo-prophylaxe.de

T +49 651 20 15 14 20

F +49 651 20 15 14 20

SOLO-MED GmbH • Nordallee 10 • 54292 Trier

SOLO Prophylaxe stoppt Zahnverlust

Eine unabhängige
Studie* belegt
die Wirksamkeit
der **SOLO-STIX**



EINE UNABHÄNGIGE STUDIE* BELEGT DIE WIRKSAMKEIT DER SOLO-STIX

Parodontose (der Knochenabbau des Kieferknochens) ist eine der häufigsten Erkrankungen im Mundraum. Unbehandelt kommt es zum Zahnverlust. Ursache des Knochenabbaus sind immer Bakterien. Sie lassen sich grundsätzlich in zwei Gruppen unterteilen:

Erstbesiedler: Diese Bakterien sind Vorhut und Wegbereiter der Parodontose


Trittbrettfahrer: Sie sind die eigentlich aggressiven Bakterien. Um wachsen zu können, benötigen sie aber die Erstbesiedler als Nährboden.

Eine Parodontose-Therapie ist dann wirksam, wenn sie das Wachstum der Bakterien unterbindet. SOLO-STIX wurden genau dafür entwickelt. Eine unabhängige Studie des Münchner Labors Lab4More bestätigt nun die Wirksamkeit dieses Vorgehens.

Bei 118 Patienten aus zertifizierten SOLO-Propylaxe-Praxen wurde die Bakterienbesiedlung in den Zahnzwischenräumen mit und ohne Verwendung von SOLO-STIX gemessen. Die Ergebnisse zeigen, dass die **Benutzung der SOLO-STIX in jedem Fall die Bakterienbesiedlung zurückdrängen konnte** – zum Teil bis zur Grenze der Nachweisbarkeit.

TYPISCH IST FOLGENDER VERLAUF:

1. Zuerst geht es den **Erstbesiedlern an den Kragen:** Diese Bakterien verschwinden teilweise sogar ganz.
2. Die deutliche Verminderung der Erstbesiedler **entzieht den Trittbrettfahrern den Nährboden** und erschwert es ihnen, weiterzuwachsen.
3. In Folge ist bei den aggressiven Trittbrettfahrern eine **deutliche Verminderung** festzustellen – teilweise bis nahe an die Nachweisgrenze.



Die Grafik zeigt, wie sich die SOLO Zahnpflege bzw. Benutzung der SOLO-STIX auf die Besiedlung der sechs wichtigsten Parodontosebakterien auswirkt.

SOLO Prophylaxe stoppt zuverlässig Zahnverlust

Durch die Reinigung der Zahnzwischenräume mit den SOLO-STIX wird die Voraussetzung dafür geschaffen, dass die anschließende Parodontosebehandlung den Erfolg hat, den sich jeder Patient wünscht: Die restlichen Bakterien werden komplett beseitigt.

Den Erfolg der SOLO-STIX können Patienten auch ohne eine Labormessung der Bakterien erkennen. Die Blutungsstellen, die beim Benutzen der SOLO-STIX vor der Parodontosebehandlung noch vorhanden sind, verschwinden nach der Behandlung vollständig. Das ist das sichere Zeichen für den Rückgang der Bakterien, die den Knochenabbau verursachen.



Eine Kombination aus SOLO-STIX und Parodontosebehandlung verhindern zuverlässig den weiteren Knochenabbau und damit den Zahnverlust. Nach einer Parodontosebehandlung ohne SOLO-STIX sieht es schon nach 14 Tagen genauso aus wie vor der Parodontosebehandlung. Die Bakterienbesiedlung und damit der Knochenabbau beginnen sofort erneut.